

Занимљив је, и читљивији „превод“ текста мудрог академика који је дао примаријус др Иван Ми-хаљев, иначе неуролог и клинички неурофизиолог, о утицају инфекције корона вирусом на његове пацијенте, и хроничне, и оне који су се први пут сусрели са неуролошким проблемима.

Ковид-19 и поремећај мождане функције



После годину и по дана од када је проглашена пандемија услед појаве вируса короне (ковид-19), са сигурношћу као лекари можемо да кажемо да је корона и много више од потенцијално смртоносног вируса који по правилу захвата плућа.

Из мог угла, као специјалисте неуролога и клиничког неурофизиолога, корона се показала као вирус који у својој акутној, а затим и у последичној постковид фази доводи до озбиљног погоршања мождане функције. Степен функционалног можданог поремећаја је био посебно значајан код оних пацијената који су већ имали дијагностикована обољења, попут епилепсије, мигрене, поремећаја сна, енцефалопатије или деменције, али се у великом броју случајева први пут јавио и код пацијената који су прележали корону али се никад раније нису лечили од наведених патолошких стања и болести.

Оно што је веома забрињавајуће, јесте чињеница да су пацијенти са купираним мигренским и епилептичним нападима после прележаног вируса короне бивали отпорни на терапију са којом су се до тада осећали одлично. Због таквог вида фармакорезистентности, код пацијената са мигреном било је потребно уводити најмање два, и то по могућству нова, до тада неордигинирана лека која се налазе у протоколу за профилаксу напада мигрене, док се код пацијената с епилепсијом, оних који су годинама уназад били без напада, у највећем броју случајева морала повећавати или чак у потпуности мењати основна терапија јер су се напади почели јављати у серијама, или се радило о епилептичном статусу као хитном ургентном стању.

Како методу избора за процену степена поремећаја мождане функције представља електроенцефалографија (ЕЕГ), највећи број пацијената је после стандардног снимања, а посебно након депривације спавања, имало много лошије налазе од оних пре оболевања од короне, или су у питању били пацијенти који су ЕЕГ дијагностику радили први пут, када су им се после прележаног вируса јавиле тегобе у виду сасвим нове, по опису неиздрживе главобоље (често мигренског или тензионог типа) или су доживели губитак свести. То посебно добија на тежини из разлога што је број урађених ЕЕГ снимања код мојих пацијената на месечном нивоу био између 250 и 300, од чега је чак 80 одсто налаза указало на постојање значајног поремећаја мождане функције.

Све што је наведено иде у прилог тврдњи да је корона опасан и веома подмукао вирус који оставља озбиљне секвеле, првенствено у оним органима где је човек најлабилнији, а у овом случају, без сумње, у питању је мозак.